

R_x DOPOLYS®

- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Từ hướng dẫn sử dụng nêu tóm tắt các thông tin quan trọng của thuốc. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC: Mỗi viên nang cứng chứa:

Thành phần dược chất:

- Cao khô lá Bạch quả (hàm lượng Ginkgo flavonoid toàn phần 1,54 mg) 7 mg
- Heptaminol hydroclorid 150 mg
- Troxerutin 150 mg

Thành phần tá dược: Microcrystallin cellulose PH101, Povidon K30, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid A200, nang cứng gelatin số 1.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

Mô tả đặc điểm bên ngoài của thuốc: Viên nang cứng số 1, nắp nang màu xanh – thân nang màu kem, bên trong có chứa bột thuốc màu vàng, vị đắng.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị triệu chứng suy tĩnh mạch bạch huyết: Nặng chân, chuột rút, đau nhức, hội chứng chân không nghỉ.
- Điều trị những dấu hiệu chức năng có liên quan đến cơn trĩ cấp.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

Luôn dùng thuốc đúng liều lượng trong đơn thuốc.

- Suy tĩnh mạch bạch huyết: 2 viên x 2 lần/ngày (2 viên vào buổi sáng và 2 viên vào buổi chiều).
- Đối với trĩ cấp, điều trị tấn công: 6-8 viên/ngày, trong 01 tuần.

Cách dùng: Dùng uống, uống thuốc trong các bữa ăn.

*** Lưu ý:**

Trong cơn trĩ cấp: Việc dùng thuốc này không thay thế được điều trị đặc hiệu cho các bệnh hậu môn khác. Nếu triệu chứng không thuyên giảm nhanh chóng, nên thực hiện khám trị và xem xét lại cách điều trị.

Trường hợp quên uống một liều dùng: Hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu thời gian gần với lần dùng thuốc tiếp theo, bỏ qua liều đã quên và hãy dùng liều tiếp theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên.

Trường hợp uống quá nhiều viên thuốc: Hãy gặp ngay bác sĩ hoặc tới khoa Hồi sức - Cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Bệnh cường giáp.
- Phối hợp với IMAO.
- Tăng huyết áp nặng.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Theo dõi huyết áp khi bắt đầu điều trị ở bệnh nhân tăng huyết áp nặng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- **Thời kỳ mang thai:** Ở người, nghiên cứu trên phụ nữ có thai ở 3 tháng đầu còn chưa đầy đủ, do đó nguy cơ do dùng thuốc chưa được kết luận. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không ghi nhận trường hợp nào trẻ bị dị dạng do mẹ dùng thuốc trong 3 tháng đầu mang thai.

- **Thời kỳ cho con bú:** Chưa có dữ liệu về sự bài tiết thuốc trong sữa mẹ, không nên dùng thuốc trong thời gian cho con bú.