

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H được bào chế từ 3 vị thuốc quý là Hoàng kỳ, Đương quy và Kỳ tử. Trong đó: **Hoàng kỳ** có tác dụng bổ khí, cố biểu, kích thích miễn dịch, tăng sức đề kháng; **Đương quy** có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, tăng chất lượng của hồng cầu, bảo vệ hệ thống miễn dịch; **Kỳ tử** có tác dụng tư bổ can thận, ích tinh, sáng mắt, làm chậm quá trình lão hóa. Chính vì thế ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H là sản phẩm đông dược có tác dụng: **Tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng phòng chống bệnh của cơ thể.**

Thành phần: Cho 1 viên

Cao đặc dược liệu (Extractum).....:285mg

Tương đương với:

Hoàng kỳ (Radix astragali membranacei).....:600mg

Đương quy (Radix angelicae sinensis).....:150mg

Kỳ tử (Fructus lycii).....:200mg

Tá dược: Calci carbonat, tinh bột sắn, avicel, magnesi stearat, HPMC 6cps, PEG 6000, talc, titan dioxyd, màu Erythrosin

.....vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên, hộp 1 lọ x 100 viên, hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên.

Tác dụng:

- Tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng phòng chống bệnh của cơ thể.

- Bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng chất lượng của hồng cầu.

Chỉ định:

Đương quy bổ huyết P/H được dùng trong các trường hợp:

- Người cần tăng sức đề kháng để phòng bệnh.

- Người thiếu máu có biểu hiện xanh xao, gầy yếu do mất máu hoặc do mới ốm dậy, ăn uống kém hoặc hấp thu kém dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng để tạo máu.

- Người hồi hộp, mất ngủ, hoa mắt chóng mặt do huyết hư.

Cách dùng, liều dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:** Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

- **Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:** Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ và dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- **Quá liều:** Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- **Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:** Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho Bác sỹ hoặc Dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sỹ

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



PHUC HUNG

Nhà SX: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy GMP WHO: CCN Thanh Oai, Hà Nội

Tel: 024.33826222 * Fax: 024.33978024

www.dongduocphuchung.com.vn



TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN CƯỚC

1800.5454.35

(Trong giờ hành chính)

ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG - THUỐC NAM CỦA NGƯỜI VIỆT